

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないこと
3. 長期連用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かゆみ、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、しっしん、しもやけ、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。塗布部を肌当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗って下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること
- (3) 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100mL中

成分	分量
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g
l-メントール	3.5g
dl-カンフル	2.0g
グリチルレチン酸	0.2g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g

添加物: マクロゴール、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、八アセチルシ糖、エタノール 含有

鎮痒消炎薬
販売名:
リッチソソDX

第②類医薬品

内容量 45mL
03



リッチソソ DX

かゆみ 虫さされ

液体

かゆみを抑える成分
ジフェンヒドラミン塩酸塩

はれ・赤みを抑える成分
デキサメタゾン酢酸エステル

清涼感成分
l-メントール dl-カンフル

45mL

第②類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 次の物には付着させないこと(変質又は変色する場合がある) 床や家具等の塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品等
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用すること
- (7) 使用後はキャップをしっかりと締め、容器を立てて、保管すること

— お客様ご相談窓口 —

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社(お客様相談窓口)
電話 0120-108-871
受付時間 9:00～17:30
(土・日・祝日を除く)

火気厳禁
第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性エタノール含有物 45mL

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

製造販売元
東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸橋1229番地