

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

指定医薬部外品

口腔咽喉薬

のどの痛み・のどのはれ・声がれに

ハヤナトローチ

(生葉エキス配合)

◆ハヤナトローチは、口内殺菌成分のセチルピリジニウム塩化物水和物と、のどに良い生葉キキョウエキスを配合したトローチ剤で、口内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの痛み・のどのはれ・声がれに効果があります。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
 - (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

のどの炎症による声がれ・のどのはれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量

次の1回量を、口中に含み、かままずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1 回量	1 日使用回数
5 才以上	1 錠	3~6 回 使用間隔は 2 時間以上あけること
5 才未満		使用しないこと

裏面もお読みください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) かみくだいたり、そのままのみ込んだりしないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成 分・分 量

1錠中

成 分	含 量	は たら き
セチルピリジニウム塩化物水和物	1.0mg	口内を殺菌・消毒し、のどのはれ、口臭を抑えます。
キキョウ乾燥エキス	22.2mg (原生葉換算量 : 100mg)	のどの炎症を抑え、のどの痛み、のどのはれ、のどの不快感、声がれに効果があります。

添加剤: グリセリン、ポビドン、アラビアゴム、ステアリン酸Ca、マクロゴール、脱脂粉乳、白糖、黄色5号、L-メントール、香料 含有

外 形	直 径 (mm)	重 量 (g)
	17mm	1.2g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) アルミ袋を開封した後、湿気により、変色することがあります。開封後はなるべく湿気の少ない所に保管し、変色したものは使用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬(株) お客様相談室

電話 0120-108871 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸柄1229番地

01DG00