

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

総合胃腸薬

胃の不快感、もたれ、むかつきに

新クリエフ[®]胃腸薬錠 〈錠剤〉

◆**新クリエフ[®]胃腸薬錠**は、食べすぎ・飲みすぎ・胃もたれ・胸やけ・胃の痛みなど食間または食後の諸症状に、制酸剤、消化酵素、健胃生薬、粘膜修復剤を配合し、優れた効果を発揮します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
排尿困難
(6)次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

裏面もお読みください。

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後または食間に、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(成人)	3錠	3回
8歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

※食間とは、食後2～3時間を指し、胃の中の食べ物がほぼなくなっている時です。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量(9錠)中

成分	含量	はたらき
合成ヒドロタルサイト	1,200mg	持続的に胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。
炭酸水素ナトリウム	600mg	即効的に胃酸を中和し、胃酸過多、胸やけを改善します。
ロートエキス3倍散	63mg	胃の痛みをしずめ、過剰な胃液の分泌を抑えます。
ケイヒ末	200mg	食欲を増進する芳香性生薬です。
ゲンチアナ末	100mg	胃のむかつき、食欲不振を改善する苦味健胃生薬です。
カンゾウ末	150mg	胃粘膜の荒れを抑えます。
センブリ末	5mg	食欲不振を改善する苦味健胃生薬です。
ビオチンアスターゼ2000	25mg	炭水化物を消化する酵素です。
プロザイム	20mg	タンパク質を消化する酵素です。
リパーゼ	60mg	脂肪の消化を促進する酵素です。
アルジオキサ	60mg	荒れた胃粘膜を修復します。

添加剤：ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、カルメロース、ステアリン酸Mg、
L-メントール、香料 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬(株) お客様相談室
電話 0120-108871 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

120T
01DH00