

### 【使用上の注意】

(相談すること) 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること ○皮膚：発疹・発赤、かゆみ 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】


(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと  
【用法・用量】成人(15才以上)、1回1本(100mL)を1日1回服用してください。●定められた用法・用量を厳守してください。●15才未満は服用しないでください。●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

お問い合わせ先 東和製薬株式会社 お客様相談室  
☎0120-108871 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

 **東和製薬株式会社**  
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

がんばるあなたの 強い味方

# リッチミン<sup>®</sup> スーパーEX

人参・淫羊藿・タウリン3000mg配合

# SUPER EX

第2類医薬品 100mL

リッチミンスーパーEX

### 【効能・効果】

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

使用  
期限

Lot.

【成分・分量】1日量1本(100mL)中  
チアミン硝酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>)10mg、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)10mg、ニコチン酸アミド50mg、無水カフェイン50mg、イノシトール100mg、タウリン3,000mg、L-アスパラギン酸ナトリウム150mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、イカリソウエキス100mg(原生薬換算量:500mg)、ニンジンエキス90mg(原生薬換算量:603mg)

添加剤：白糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、キサンタンガム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、グリセリン 含有(アルコール0.2mL以下)

●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色くなる場合があります。

ガラス：瓶 金属：キャップ

OJH