

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

眼科用薬

目の酷使による疲れ目に

フジアイ®プレミアム R [目薬] 15mL

- ◆フジアイプレミアムRは、目のピント調節機能改善作用のあるネオオスチグミンメチル硫酸塩とシアノコバラミン（ビタミンB₁₂）などの成分を含む12種類の有効成分を配合し、目の酷使による疲れ目や結膜充血などを改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 目のかすみ改善されない場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえて充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。（汚染や異物混入の原因となることがあります。）また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にはのみ使用してください。

裏面もお読みください。

成分・分量

100mL中

成分	含量	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	目の充血を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピント調節をする毛様体に直接作用して、目の疲れを取り除きます。
イプシロン-アミノカプロン酸	1,000mg	炎症物質の生成を抑えます。
アラントイン	60mg	結膜の炎症をしずめます。
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	目の炎症をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	目のかゆみや充血などの不快な症状をやわらげます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	20mg	ピント調節機能を改善し、目の疲れをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	25mg	血行を促進し、目の疲れをやわらげます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	1,200mg	目のはたらきを円滑にして、目の疲れを回復します。
タウリン	400mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	うるおいを保ち、角膜を保護することで目の疲れをやわらげます。

添加剤：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、クロロブタノール、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤 含有

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど高温下に放置しないでください。
(容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- 点眼中に薬液がこぼれて衣服などに着色した場合は、速やかに洗い流してください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 (048)648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地