

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

便秘薬 おなかに優しく、自然に近いお通じを

ツウカイ[®]Mg 〈錠剤〉

- お腹に優しい非刺激性の便秘薬です。
- 酸化マグネシウムが腸内に水分を集め、便をやわらかくし、自然に近いお通じを促します。
- 症状に合わせて適切な分量を服用できます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
 - (5) 次の診断を受けた人 腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状	関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐	呼吸器	息苦しい
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる	その他	筋力の低下、口のかわき
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる		

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量を1日1回就寝前(又は空腹時)に水又はぬるま湯で服用してください。
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3~6錠	1回
11才以上15才未満	2~4錠	
7才以上11才未満	2~3錠	
5才以上7才未満	1~2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

服用方法のアドバイス

- 就寝前(又は空腹時)にコップ1~2杯の水又はぬるま湯で服用してください。多めの水で服用すると、より効果的です。
- 効果には個人差があります。初回は最小量(15才以上の場合3錠)から始め、便通の具合や症状に合わせて用法・用量の範囲内で少しずつ増量又は減量してください。

成分・分量

1日量(6錠)中

酸化マグネシウム 2,000mg

添加物：無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Ca 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)

電話 048-648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

01CG00