

フジアロー[®] 外傷液

⇨ここから開けてください


第2類医薬品

第2類医薬品

FIRST-AID SPRAY

フジアロー[®] 外傷液

色がつかないスプレー式
外傷救急薬



殺菌・消毒、切傷、すり傷に

外用専用 50mL

株式会社 富士薬品

配置期限

第2類医薬品

フジアロー[®] 外傷液

効果的な使用方法



傷の処方に

容器の口を上にして、容器を瞬間的に強く押してください。
内容薬液が霧状に出ます。



傷口の洗浄に

容器の口を下にして、容器を軽く押してください。
そのまま内容薬液が流れます。



傷の消毒に

容器を軽く押し、内容薬液を脱脂綿又はガーゼに浸してください。



キャップがきつい場合には、ちょっつがいを押してください。あげ易くなります。

50mL

↑
差込んで保管してください

殺菌・消毒、切傷、すり傷に フジアロー外傷液 第2類医薬品

切傷、すり傷などには速やかな処置が必要です。フジアロー外傷液はスプレー式の殺菌消毒液で、痛みを緩和して創傷面を保護し、傷の修復をはやめます。

【使用上の注意】

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量】100mL中

- ・ベンゼトニウム塩化物 100mg
 - ・ジブカイン塩酸塩 100mg
 - ・クロルフェニラミンマレイン酸塩 200mg
 - ・ナファゾリン塩酸塩 100mg
 - ・アラントイン 200mg
- 添加剤：エデト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有

製造販売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地
電話(048)648-1118(土、日、祝日を除く)

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】
(1) 用法を守ること。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(3) 目に入らないよう注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
(4) 本剤は外用にのみ使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある。)
(4) 配置期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



60442