

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2)創傷面、目の周囲、粘膜等

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4)患部が広範囲の人
- (5)湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

虫さされ、かゆみ、皮ふ炎、かぶれ、
湿疹、あせも、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。
※塗布部をお肌当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4)本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることもある
- (5)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないこと
- (6)外用にのみ使用すること

成分・分量

100mL中

成分	分量
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15 g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g
クロタミトン	5.0 g
dl-カンフル	1.0 g
l-メントール	3.5 g
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g

添加剤：マクロゴール、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、クエン酸水合物、クエン酸Na水合物、ジブチルヒドロキソトルエン、ハアセチルしょ糖、エタノール含有

かゆみ 虫さされ

フジアロー[®]-EX

液体

ジフェンヒドラミン塩酸塩

PVA^{配合}

クロタミトン

l-メントール

40mL

第②類医薬品

セルフ医薬品
税 控除 対象

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4)火気に近づけないこと。また、使用後は火中に投げないこと
- (5)次の物には付着させないこと
(変質又は変色する場合があります)
床や家具等の塗装面、メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品等
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること
- (7)揮発性があるので、使用後はキャップをしっかりとか締めること

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

販売名：
フジアロー-EX

内容量

40mL

紙 : 箱

ラベル : ボトル
キャップ

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性
エタノール含有物 40mL

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区榎木町4丁目383番地
電話(048)648-1118(土、日、祝日を除く)

富士薬品