

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

しっしん・かぶれ・かゆみ止め

新フジアロー<sup>®</sup>-H

10g

- ◆ **新フジアロー-H**は、炎症を緩和し、かゆみ等の症状をしずめる効果があります。  
また、皮膚患部を保護し、化膿を防いで治癒を促します。



## 使用上の注意

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。  
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)患部が広範囲の人
  - (5)湿潤やただれのひどい人
  - (6)深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

## 成分・分量 100g中

成分	含量	はたらき
コルチゾン酢酸エステル	500mg	副腎皮質ホルモンで湿疹、皮膚炎、かゆみ、虫さされによる炎症を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	300mg	かゆみや炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	200mg	局所麻酔作用により患部のかゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	500mg	皮膚の血行を促進し、患部の治りをはやめます。
グリチルレチン酸	500mg	患部の炎症をしずめます。
アラントイン	200mg	化膿を防ぎ、肉芽形成作用により患部の治りを促進します。
イソプロピルメチルフェノール	300mg	殺菌・抗菌作用により、化膿を防ぎます。

添加剤：流動パラフィン、セタノール、グリセリン脂肪酸エステル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、ポリソルベート80、ジメチルポリシロキサン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、パラベン、乳酸、エデト酸Na水和物 含有

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）  
電話 (048)648-1118 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**株式会社 富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

021F00