

↑  
1. 0.2g / 2.0g 量計のやり方

## フジアロー®EX10液

(鎮痒消炎薬) 第②類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### ▲ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないこと (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないこと
3. 長期連用しないこと

#### ★ 相相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)火気に近づけないこと
- (5)次の物には付着させないこと(変質又は変色する場合がある)床や家具等の塗表面、メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用すること
- (7)使用后はキャップをしっかりと締め、容器を立てて、保管すること

### 火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性  
エタノール含有物 40mL

製造販売元：株式会社 富士薬品  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先  
株式会社 富士薬品(学術室)  
☎048-648-1118  
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

商品詳細へ



## フジアロー®EX10液

⇨ ここから開けてください

ダニノミ毛虫ムカデ 皮膚用薬 液剤 40mL  
などによる

虫さされかゆみに 第②類医薬品

がまんできないかゆみに

## フジアロー® EX10液

ダニノミ毛虫ムカデ などによる

## 虫さされ・ かゆみに

アンデラッグステロイド(PVA)配合  
(患部ではよく効き、体内では低活性化)



10種類の  
有効成分  
配合

液剤 40mL

セルフメディケーション  
税 控除 対象

富士薬品

第②類医薬品

### 効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

### 用法・用量

- 1日数回、適量を患部に塗布してください。  
(用法・用量に関連する注意)  
(1)定められた用法・用量を守ること  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること  
(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること  
(4)本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがある(5)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないこと  
(6)外用にのみ使用すること  
※塗布部を肌当てで軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

### 成分・分量 <100mL中>

フルドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル(PVA)	0.15g
グリチルレチン酸	0.2g
リドカイン	2.0g
ジフェニドラミン塩酸塩	2.0g
クロタミドン	5.0g
サリチル酸グリコール	1.0g
dl-カンフル	0.1g
アラントイン	0.2g
dl-カンフル	1.0g
l-メントール	3.5g

添加物：プロピレングリコール、ラウロマクゴロール、乳酸、乳酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、エタノール 含有

使用期限(上段) 製造番号(下段)



4 987524 104628