

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### △ 使用上の注意

- ☒ してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1.次の部位には使用しないこと  
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部  
(2)創傷面、目の周囲、粘膜等  
2.顔面には、広範囲に使用しないこと  
3.長期連用しないこと

### ■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人  
(3)薬などによりアレルギー症状を起したことがある人  
(4)患部が広範囲の人  
(5)湿潤やただれのひどい人  
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 関係部位 症状

皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚	みずむし・たむし等の白斑、にき(患部)び、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性  
エタノール含有物 30mL

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること  
(2)小児の手の届かない所に保管すること  
(3)他の容器に入れ替えないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある)  
(4)火気に近づけないこと  
(5)次の物には付着させないこと(変質する場合がある)  
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化織製品、皮革製品等  
(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。  
また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用すること  
(7)染めた髪につくと色落ちすることがある

塗りやすい  
ピンポイント容器



# 頭皮のかゆみ 湿疹に

9つの有効成分が  
すばやく効く

アンチドラッグステロイド剤 PVA配合

30mL  
フジアローHD液

第②類医薬品

副作用被害救済制度  
電話: 0120-149-931

製造販売元

株式会社富士薬品  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地


### 効能・効果

かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

### 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

#### 〈液容器の使用方法〉



● 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。  
(暑い時期には内圧が高まり、薬液が多くなることがありますので、これを防ぐためです)

● 患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあわせて塗布してください。  
(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります)

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ること  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること  
(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること  
(4)外用にのみ使用すること

### 成分・分量

100mL中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 0.15g、グリチルレチン酸0.2g、リドカイン2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩2.0g、クロタミトン5.0g、サリチル酸グリコール1.0g、イソプロピルメチルフェノール0.5g、アラントイン0.2g、l-メントール3.5g

添加剤: プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、乳酸、乳酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、ヒプロメロース、エタノール 含有

### 第②類医薬品

販売名:  
フジアローHD液  
鎮済消炎葉  
内容量 30mL

お問い合わせ先  
株式会社 富士薬品  
(学術室)  
電話 (048) 648-1118  
9:00~17:30  
(土、日、祝日を除く)

