

## リッチミンゴールド

### 【使用上の注意】〔相談すること〕

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること ○皮膚：発疹・発赤、かゆみ 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある) (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと

### 【成分・分量】

1日量1本(50mL)中  
チアミン硝化物(ビタミンB1) 10mg、リボフラビンリン酸エステルNa(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 30mg、ニコチン酸アミド50mg、無水カフェイン50mg、イノシトール50mg、タウリン1,500mg、インヨウカク流エキス0.5mL(原生薬換算量:500mg)、エゾウコギ流エキス0.2mL(原生薬換算量:200mg)、クコシ流エキス0.1mL(原生薬換算量:100mg)、オウセイ流エキス0.1mL(原生薬換算量:100mg)、ローヤルゼリーチンキ200mg(原生薬換算量:200mg) 添加剤:白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、安息香酸Na、香料、エタノール含有(アルコール0.5mL以下) ○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルNaにより、尿が黄色くなることがあります。

忙しい現代社会に ここぞの1本

# リッチミン<sup>®</sup> ゴールド

生薬4種(黄精・枸杞子含む)  
ローヤルゼリー配合

# GOLD

第2類医薬品 50mL

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、  
肉体疲労・病中病後・  
食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・妊  
娠授乳期などの場合の  
栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15才以上)、1日  
1回1本(50mL)を  
服用してください。  
○定められた用法・  
用量を厳守してくだ  
さい。○15才未満は  
服用しないでくださ  
い。○本剤は生薬成  
分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

製造販売元 株式会社 富士薬品  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先(学術室)

☎048-648-1118

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:瓶 金属:キャップ OAD

使用  
期限

Lot.

