

T12



成分・分量 1.0㎡中  
 dl-カンフル…1.80g l-メントール…4.50g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ油…1.20g  
 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g ノニル酸リニリアミド…0.01g  
 添加剤：ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキソエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号 含有

使用期限

肩と痛みのダイラップE 第3類医薬品

第3類医薬品

富士薬品

ダイラップE

肩と痛みに

●患部の血行を改善して痛みを鎮める

ビタミンE配合

関節痛

腰痛

肩こり

貼付剤 16枚入り

肩と痛みのダイラップE 第3類医薬品  
ここから開けてください

03A177

第3類医薬品

ダイラップE

関節痛

腰痛

肩こり

ビタミンE配合

肩と痛みにダイラップE

第3類医薬品

△使用上の注意

☒してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、痛み
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お客様相談窓口 大協薬品工業株式会社  
TEL 076-479-1313(土、日、祝日を除く)



効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

- 1 日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。  
(用法・用量に関連する注意)
- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタンや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

保管及び取り扱ひ上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

16枚入り(1枚の寸法7.4cm×5.2cm)

製造販売元  大協薬品工業株式会社  
富山市水橋第173

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-9311