

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

サンツールDFテープLα (外用鎮痛消炎薬) 第2類医薬品 [1枚:10cm×14cm] 7枚入

△使用上の注意

- ×してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児
 2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
 4. 連続して2週間以上使用しないでください。

- ※相談すること**
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 他の医薬品を使用している人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) テープ剤がかぶれ等を起こしたことがある人 (5) 次の診断を受けた人 消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ (6) 次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (7) 高齢者
 2. 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ)(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。	
症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸瀬 1229番地

発売元：株式会社富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

商品詳細へ



副作用被害救済制度
☎0120-149-931



10cm

14cm

ここを押して開けてください。

痛みを鎮める
サンツール
DFテープLα

肩の痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬 テープ 7枚

痛みを鎮める
サンツール
DFテープLα

肩の痛み・腰痛
筋肉痛・関節痛

外用鎮痛消炎薬 テープ 7枚

第2類医薬品

痛みを鎮める サンツール® DFテープLα

肩の痛み 腰痛 筋肉痛 関節痛

外用鎮痛消炎薬 テープ 7枚

第2類医薬品


肩の痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープLα

鎮痛力 ジクロフェナク ナトリウム配合 + L-メントール

広い範囲に便利な
Lサイズ

全方向伸縮
タイプ



貼り方

- 1 中央のフィルムをはがし患部にはりませう
- 2 残ったフィルムを片方ずつはがしてはってください

「テープ」7枚入
1枚サイズ 10cm×14cm

富士薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープLα

外用鎮痛消炎薬 テープ 7枚

第2類医薬品

製造番号
使用期限