

開け口

販売名
フジアローHPクリーム

第2類
医薬品

特徴

- ヘパリン類似物質 0.3%配合
保湿作用・抗炎症作用・血行促進作用があります。
- 油性クリーム (W/O型)
肌にしつかり密着し、外部の刺激から患部を守ります。
- 赤ちゃんから使えます。
無香料・無着色でステロイドやエタノールは入っていません。

フジアロー
HPクリーム

刺激
外部からの刺激
をブロック
します

ヘパリン類似物質



(イメージ図)

肌には本来バリア機能があり、水分の蒸発や外部からの刺激をブロックし、からだを守っています。
一方、皮膚が乾燥した状態（バリア機能が低下した状態）になると、水分が逃げやすくなり、外部からの刺激に弱い状態になってしまいます。
フジアロー HP クリームは、肌本来のバリア機能を高め、肌の潤いを取り戻します。

※出血のある傷口には使用しないでください。
(血が止まりにくくなることがあります。)

※顔面のきず・やけどのあとには使用しないでください。

※かさぶたには使用しないでください。

発売元 株式会社富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

問い合わせ先 株式会社富士薬品(学術室)

電話 (048)648-1118

受付時間：9:00～17:30 (土, 日, 祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町横越16番1

[効能・効果]

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ・乾皮症・小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあととの皮ふのしこり・つぶり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

[用法・用量]

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください。

[用法・用量に留意する注意]

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 自入らないようご注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

[成分・分量]

100g 中

ヘパリン類似物質…0.3g

添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデcanoール、ジメチルポリシリコサン、グリセリン脂肪酸エステル、ラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、硫酸マグネシウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、精製水を含有します。

[保管及び取り扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。



4 987524 905317

第2類医薬品

乾燥肌の保湿・改善に
フジアローHPクリーム

ご使用に際して、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜(口腔、鼻腔、瞳など)

⚐ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ、はれ、紫斑