

商品詳細へ

開け口

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

特 徴

消炎鎮痛成分サリチル酸グリコールが患部に浸透し、肩こり、筋肉痛に効果を發揮します。

ノニル酸ワニリルアミドの局所温感刺激作用により、血行不良を改善し、肩こり、腰痛を改善します。

**痛みにサツと塗れる
サンツール[®] GL液**

外用消炎鎮痛薬 外用液 100mL

**肩こり・腰痛
筋肉痛**

第3類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わることがある)
- (4) 火気につけてはいけないこと
- (5) 火の中に投げないこと
- (6) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないこと
- (7) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがあるので、付着しないように注意すること
- (8) 本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること

火気厳禁
第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性エタノール含有物

外用消炎鎮痛薬
販売名: サンツールGL液

第3類医薬品 内容量 100mL

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎ 048-648-1118
9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

紙 : 箱 ボトル : キャップ
ボトル : 塗布栓ラベル

セルフメテインケーション
税控除対象

03

液剤 100mL
外用消炎鎮痛薬
第3類医薬品

富士薬品

使用期限

製造番号

**第3類医薬品
サンツール[®] GL液**

機能・効果
腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法・用量
1日数回、適量を患部に塗布して下さい。
(用法・用量に関する注意)
(1) 用法・用量を守ること
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
(3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
(4) 外用のみ使用すること
(5) 入浴する1時間前からは使用しないこと。また、薬剤が肌に残っている場合、入浴時や汗をかいた時には、強い刺激を感じることがある
(6) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
(7) 皮膚の弱い方は、同じ所に続けて塗布しないこと
(8) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
(9) 使用後は手を洗うこと

成分・分量 <100g中>

サリチル酸グリコール	10.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.025g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g
I-メントール	2.0g
添加物: マクロゴール、プロピレンジコール、クエン酸水和物、エタノール	含有

4 987524 105014

製造販売元: 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸橋1229番地

発売元: 株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

C155